

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основным путём передачи птичьего гриппа человеку является контакт с больной домашней птицей или предметами, загрязнёнными её помётом. Наиболее высок риск заражения во время забоя, ощипывания, обработки и подготовки птицы для кулинарного приготовления.

Птица подлежит обязательной регистрации в администрации муниципального образования и в учреждении государственной ветеринарной службы. При регистрации птицы их владельцы будут ознакомлены с правилами содержания птицы, и в этом случае она будет обязательно учтена при вакцинации.

Запрещается держать птицу в квартирах, местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на лоджиях и балконах.

При продаже и транспортировке домашней птицы за пределы города, района оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца в учреждении государственной ветеринарной службы.

Строения для содержания домашней птицы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте. Периодически (2-3 раза в неделю) необходимо обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, лопаты, бадьи) 3% горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнёзда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. Помёт птицы необходимо складировать в одном месте для его биотермического обеззараживания.

Корм для домашней птицы необходимо хранить в плотно закрытых и водонепроницаемых ёмкостях. Перед скармливанием корма обезвреживать термической обработкой.

В период угрозы птичьего гриппа, для предотвращения заражения домашних птиц, в индивидуальных хозяйствах необходимо всех птиц перевести на закрытое содержание, а на подворье установить пугала и трещётки для отпугивания диких птиц. В это время не рекомендуется покупать живых птиц для разведения или увеличения поголовья.

У заболевших домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетённое состояние. Отмечаются синюшность, опухание и почернение гребня и серёжек, а так же затруднённое дыхание.

В случае обнаружения больной или мёртвой птицы в домашних подворьях граждан нужно немедленно известить об этом ветеринарную службу. Необходимо избегать контакта с заболевшей или мёртвой птицей. Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого рабочей одежде. После окончания работы халаты стирают, сапоги чистят и моются мылом. Предметы одноразового пользования уничтожают. Руки моют с мылом.

Нельзя покупать продукты птицеводства, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, в местах несанкционированной торговли.

Продукты птицеводства следует употреблять в пищу только после термической обработки: яйца нужно варить не менее 10 минут, а мясо не менее 30 минут при температуре 100 градусов С.

После контакта с больной птицей необходимо в течение 7 дней контролировать температуру тела. В случае повышения температуры, а также при появлении симптомов острого респираторного заболевания или инфекции глаз – немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Государственная ветеринарная служба Шенкурского района

Памятка для населения «Меры по профилактике гриппа птиц»

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.

Пути заражения:

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мёртвой домашней и дикой птицей.

У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетённое состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и серёжек, а также затруднённое дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения заражённых птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём, и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры + 70 градусов убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека.

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 градусов и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, отдышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц.

В первые дни после заболевания применяют противовирусные препараты: гамма-интерферон, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и знамивир (Реленза). Препараты применяются только при назначении врача.

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики.

Необходимо избегать контакта с домашними и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоёмах. Выгул домашней птицы должен производиться только на частных подворьях граждан.

Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яиц в местах несанкционированной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипячёную воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

ПАМЯТКА
по недопущению заноса и
распространения вируса высокопатогенного ГРИППА ПТИЦ
в популяции домашних животных

Владельцам птицы рекомендуется не допускать:

- контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных подсобных хозяйствах;
- потрошение охотничьих трофеев на территории дворов и скармливание отходов домашней птице;
- посторонних лиц в места содержания домашней птицы;
- употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

Владельцы птицы ОБЯЗАНЫ!:

- Осуществлять поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
- Обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- Осуществлять приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца из благополучных источников, воздерживаясь от приобретения живой птицы на рынках и несанкционированных мест торговли;
- Обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении таким образом, чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами диких и синантропных птиц;
- Организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать инвентарь в чистоте;
- Своевременно проводить уборки дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- Кормление птиц осуществлять в помещении, в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц;
- Разные виды птиц содержать отдельно;
- Использовать пух и перо для бытовых целей только после тепловой обработки;
- Иметь запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки;
- Обеззараживать помет и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

Государственная ветеринарная служба Шенкурского района

Охотникам – о птичьей гриппе
(несколько правил, которые следует выполнять
во время охоты на водоплавающую дичь)

1. Отстреливать только здоровую птицу.
2. Недопустимо привозить необработанную птицу домой.
3. Перед ощипыванием и потрошением птицу опустить на несколько минут в кипяток или обработать открытым огнём (костёр, паяльная лампа).
4. При потрошении птицы избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью, фекалиями и т.д.
5. После обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину. Недопустимо скармливать внутренние органы птицы другим животным.
6. Как можно чаще мыть руки с мылом.
7. Не прикасаться к другим предметам и лицу во время ощипывания и потрошения птицы.
8. После охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.
9. При кулинарной обработке птицы необходимо соблюдать правила гигиены, птицу хорошо проварить или прожарить. Кухонный инвентарь тщательно промыть с мылом, обдать кипятком.
10. В течение 7-10 дней после контакта с дикой птицей при появлении симптомов гриппа или инфекции глаз немедленно обращаться за медицинской помощью.

Государственная ветеринарная служба Шенкурского района